



## คำแนะนำการให้วัคซีนโควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุข

ผ่านมติการประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ครั้งที่ 8/2565 วันที่ 9 ธันวาคม 2565

มติการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 10/2565 วันที่ 21 ธันวาคม 2565

และมติการประชุมติดตามสถานการณ์ กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 3 วันที่ 27 ธันวาคม 2565

กลุ่มเป้าหมาย	เข็มที่ 1	ระยะห่างระหว่างเข็ม	เข็มที่ 2	ระยะห่างระหว่างเข็ม	เข็มที่ 3 (กระตุ้นครั้งที่ 1)	ระยะห่างระหว่างเข็ม	เข็มกระตุ้นเข็มที่ 4 (กระตุ้นครั้งที่ 2) ขึ้นไป
ผู้ที่มีอายุ 6 เดือน - 4 ปี	Primary series - Pfizer ฝาสีแดง 3 เข็ม; เข็มที่ 1 และ 2 ห่างกัน 4-8 สัปดาห์, เข็มที่ 2 และ 3 ห่างกันอย่างน้อย 8 สัปดาห์					ยังไม่มีคำแนะนำ	ยังไม่มีคำแนะนำ
ผู้ที่มีอายุ 5 - 11 ปี	Pfizer ฝาสีส้ม	4-8 สัปดาห์	Pfizer ฝาสีส้ม	3 เดือน	Pfizer ฝาสีส้ม	4 เดือนขึ้นไป	Pfizer ฝาสีส้ม
ผู้ที่มีอายุ 12 - 17 ปี	Pfizer ฝาสีม่วง	4 สัปดาห์	Pfizer ฝาสีม่วง	3 เดือน	Pfizer ฝาสีม่วง เต็มโดส/ครึ่งโดส	4 เดือนขึ้นไป	Pfizer ฝาสีม่วง
ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป	Pfizer ฝาสีม่วง	4 สัปดาห์	Pfizer ฝาสีม่วง	3 เดือน	Pfizer ฝาสีม่วง	4 เดือนขึ้นไป	Pfizer ฝาสีม่วง หรือ AstraZeneca
	AstraZeneca (ทางเลือก)	8 สัปดาห์	AstraZeneca (ทางเลือก)	3 เดือน	Pfizer ฝาสีม่วง หรือ AstraZeneca <sup>2</sup>	4 เดือนขึ้นไป	Pfizer ฝาสีม่วง
	AstraZeneca (ทางเลือก)	4 สัปดาห์	Pfizer ฝาสีม่วง (ทางเลือก)	3 เดือน	Pfizer ฝาสีม่วง หรือ AstraZeneca	4 เดือนขึ้นไป	Pfizer ฝาสีม่วง หรือ AstraZeneca <sup>3</sup>

1. ผู้ที่มีประวัติเคยเป็นโควิด 19 มาก่อน ในกรณีที่ไม่เคยฉีดวัคซีนมาก่อน หรือเคยฉีดมาก่อนเพียง 1 เข็ม ควรให้ฉีดวัคซีนกระตุ้น หลังจากเป็นโรคประมาณ 3 เดือน, กรณีที่เคยฉีดวัคซีนมาก่อนอย่างน้อย 2 เข็ม ให้ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นหลังจากเป็นโรคอย่างน้อย 6 เดือน
2. กรณีผู้ประสงค์รับเฉพาะวัคซีน AstraZeneca ชนิดเดียว ให้เว้นระยะห่างระหว่าง AstraZeneca เข็มที่ 2 และ AstraZeneca เข็มกระตุ้น เป็นเวลา 6 เดือน - 1 ปี (เร็วที่สุด 3 เดือน กรณีมีการระบาด)
3. กรณีผู้ที่เคยรับวัคซีน AstraZeneca เป็นเข็มกระตุ้นครั้งที่ 1 แล้ว การจะได้รับ AstraZeneca เป็นเข็มกระตุ้นครั้งที่ 2 ควรเว้นระยะห่าง 6 เดือน - 1 ปี (เร็วที่สุด 4 เดือน กรณีมีการระบาด)
4. ในกรณีอื่น ๆ สามารถพิจารณาให้วัคซีนตามความสมัครใจและความจำเป็นอื่น ๆ ภายใต้ดุลพินิจของแพทย์
5. คำแนะนำเป็นไปตามข้อมูลทางวิชาการในปัจจุบัน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามผลการศึกษาวิจัยที่มีเพิ่มเติมในอนาคต